수면과 간질

손 영 민

가톨릭의과대학 신경과학교실

Sleep and Epilepsy

Young Min Shon

Department of Neurology St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea #62 Youido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-713, Korea

The relationship of sleep and epilepsy demonstrates the complicated association of brain physiology and dysfunction. Sleep affects the distribution and frequency of epileptiform discharges in humans and influences the rate of kindling in animals. Epileptic discharges, on the other hand, alter sleep regulation and provoke sleep disruption. Individuals with epilepsy frequently complain of symptoms suggestive of disturbed sleep, such as excessive daytime sleepiness, insomnia, or with more subtle complaints such as an increase in seizure frequency. More commonly, these symptoms indicate an underlying sleep disorder rather than the effect of epilepsy or medication on sleep. Clinicians must be able to identify and differentiate between potential sleep disorders and sleep dysfunction related to epilepsy and direct therapy to improve the patient's symptoms. The reciprocal relationship of sleep and epilepsy and the management of sleep complaints in the patient with epilepsy will be reviewed.

Key Words : Sleep, Epilepsy

서 론

수면과 간질은 두뇌의 생리와 기능 이상을 대표하는 것으로 서로 밀접한 연관이 있다. 수면은 발작과의 분포와 빈도에 영향을 주고, 동물에서는 kindling의 정도를 조절한다고 알려져 있다. 간질은 정상적인 수면리듬을 분절시키고 연속성을 저해하며 그리고 항간질약물들은 간질병소 이외의 정상적인 주변 뇌조직들도 억제함으로써 질환 자체와 질환의 치료가 모두 비정상적인 수면의 원인이 될 수 있다. 간질환자들은 자주 수면장애를 호소하는데, 주로 주간 과다수면, 불면증, 야간발작의 증가로 인한 잦은 각성 등으로 나타난다. 또

한 이들 증상은 간질이나 항간질약물의 간접적인 영향 때문이 아닌 근본적인 수면장애에 기인한 경우가 많다. 저자는 수면과 간질의 상호연관성에 대해 언급하고, 간질환자에서의 경험할 수 있는 수면문제와 그 해결방법에 관하여 알아보고자 한다.

본 론

1. 경련에 대한 수면의 영향

수면이 경련에 뚜렷한 영향이 미친다는 것은 널리 알려져 있는데, Gower 등은 이미 1881년에 약 21%의 환자들은 수면 중에만 경련을 한다는 사실을 보고하였고,¹ 이후 Janz 등은 일부의 경련 환자들이 잠에서 깨어난 후 2 시간 이내에 주로 경련을 경험하는 것을 밝히고, 이를 awakening epilepsy (각성간질)라고 명명하였고² 이의 대표적인 예로 juvenile

* Address of correspondence

Young Min Shon

Department of Neurology St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea #62 Youido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-713, Korea
Tel: +82-2-3779-2077(1323), FAX: +82-2-783-9532
Email: sonogung@catholic.ac.kr

myoclonic epilepsy(JME)을 들 수 있다. 반대로 benign epilepsy of childhood with centrotemporal spikes나 autosomal-dominant nocturnal FLE등은 수면 중에 주로 나타난다. 수면의 시기(stage)도 중요한 연관성을 보이는데, 대부분의 경련은 NREM 시기에 발생되며, 특히 2기 수면 때가 가장 빈도가 높고 반면 REM 시기에는 가장 빈도가 낮은 것으로 알려져 있다.^{3,4} 그리고, 경련은 각성(arousal) 시기 근처나 기상(awakening) 직후에 많은데, 경련이 각성을 유발한 것인지 아니면 그 반대인지는 분명치 않다. 각성 후 초래되는 시상-대뇌피질 활성화(thalamo-cortical activation)가 경련의 전파를 촉진할 것으로 보이나 내측두엽을 자극한 동물실험에서는 오히려 경련의 시작이 각성을 촉진 시키는 결과를 보였다.^{5,6} 경련의 발생부위도 관련이 높은데, 전두엽 간질은 수면 중에 자주 발생되고 이는 다른 발작병소에 비해 유의하게 빈도가 높았다.³ 일주기 리듬과의 연관성에 대한 연구에서는 수면과 체온주기가 인간과 정반대인 rat이 모두 부분 발작의 빈도가 오후 중반기(midafternoon)에 가장 높았는데, 이는 원인에 대해서는 알려져 있지 않다.⁷⁻⁹

1) 수면시기 (sleep stage)와 수면박탈 (sleep deprivation)의 경련에 미치는 영향

수면 자체는 발작간기(interictal period)의 발작파를 약 1/3의 환자에서 활성화시키며, 많게는 90%까지 증가시킨다고 알려져 있다.^{10,11} 따라서 수면박탈이 발작파를 증가시키는 이유가 수면 부족으로 인한 신체의 변화에 기인한 것인지 아니면 수면의 증가 자체 때문인지는 아직 확인되지 않았다.¹² 표 1에서 NREM시기와 REM시기의 발작파의 양상을 비교하였는데, 수면의 시기가 깊어질수록 발작파는 자주 나타나며, 공간적으로도 넓게 분포하는데, 그 이유는 깊은 수면에서는 다수의 신경세포가 휴식을 취하면서 상대적으로 적은 신경세포가 활성화되고 또한 시상-대뇌피질 연결 세포들(relay neurons)이 더욱 활성화되면서 발작파도 영향을 받기 때문이다.¹³ 그러나 내측두엽 간질환자에서 심부전극으로 기록한 수면뇌파를 분석한 연구에서는 오히려 3, 4기나 REM

시기에 신경세포의 활성화가 촉진되며 동기화(synchronization)도 정상 해마의 신경세포보다 늘어나는 결과를 보여 수면이 간질병소에는 큰 영향을 미치지 못한다고 하였다.¹⁴ REM수면시기에는 경련의 발생이 억제되는데, 이는 동물실험에서 경련을 유발하기 위해 보다 많은 전류가 소요되는 결과와 일맥상통한다.¹⁵ 그러나, 최근 연구에서는 간질감시병동에 입원한 측두엽 간질환자들에서 수면박탈을 한 군과 그렇지 않은 군들 간의 경련발생이 차이가 없다는 보고도 있어 난치성 간질에서의 수면과 간질의 연관성에 대해서는 이론이 많은 상태이다.¹⁶

2. 수면에 대한 간질의 영향

간질환자들은 수면이 불안정한데, 항경련제 투여 후 잦은 각성을 자주 호소한다. 이는 간질이 환자들로 하여금 피로감을 느끼게 하는 주요 원인이 된다.

1) 수면구조에 미치는 영향

경련 후 졸립현상과 불면증(postictal somnolence and insomnia)는 가장 흔한데, 수면의 분절현상과 REM수면의 단축이 유발된다. 77명의 일차성, 이차성 전신발작 환자를 대상으로 한 연구에서는 발작 직후의 밤 東岸에 총 수면시간의 감소, REM수면의 감소, WASO의 증가, 2기 수면의 증가 등이 발작이 없던 밤에 비해 유의하게 관찰되었다고 하였다.¹⁷ 정상인과의 비교 연구에서는 환자군에서 유의하게 총 수면시간과 REM수면이 감소하였다고 보고하였다.¹⁸ 낮 동안의 경련도 당일 밤의 수면에 영향을 주어 REM수면과 4기 수면을 감소시키며, 이는 경련이 전형적인 postictal 시기 이후에도 규칙적인 수면을 저해한다는 것을 시사한다.¹⁹

2) 발작간기 (interictal state)와 수면

경련이 없는 수면 동안에도 sleep efficiency의 저하, 수면주기의 잦은 전환, 각성의 증가 등이 정상인에 비해 간질 환자에서 증가되고 부분발작이 전신발작보다 그 정도가 심하

Table 1. Effect of Sleep Stage on Interictal and Ictal Discharges.

NREM Sleep	REM Sleep
Seizure Promotion	Seizure Inhibition
Synchronization of EEG	Desynchronization of EEG
More frequent interictal discharges	Less frequent interictal discharges
Wider spread of interictal discharges	Greater localization of interictal discharges
Increase likelihood of seizures	Infrequent seizures
Greatest potential for epileptogenesis	Greater REM sleep time results in fewer seizures
	Least potential for epileptogenesis

다고 알려져 있다.¹⁷ 그리고 이중 새로이 진단된 환자에서 carbamazepine으로 치료한 후 이러한 양상은 호전되는 것으로 보아 발작간기의 발작과가 수면에 영향을 미치는 것으로 보인다. 간질환자들의 수면뇌파에선 여러 변화가 관찰될 수 있는데, 수면방추파(sleep spindle)의 낮은 amplitude와 형태변화, 그리고 NREM과 REM시기에 알파-주기 리듬이 혼입 등이 관찰된다.²⁰

3. 간질치료가 수면에 끼치는 영향

항경련제의 효과는 경련을 유발하는 신경세포에만 선택적으로 작용하지 않고 비특이적으로 작용하므로 정상적인 수면 구조에 많은 영향을 끼칠 수 있다. 고전적인 항간질약제들은 대개 신경세포의 기능억제로 인한 졸림증을 유발하는데, 일부에선 반대로 불면증이 나타나기도 한다. Phenytoin은 소듐과 칼슘이온채널을 억제하여 신경흥분을 억제하는데, 알파 NREM수면을 늘리는 반면 수면의 효율과 잠복기를 낮추는 단점이 있다.^{21,22} Carbamazepine도 REM수면을 줄이고, 수면기의 전환(sleep stage shift)을 조장하는 성질이 있는데,²³ REM수면을 줄인다고 알려진 삼환계 항우울제와 이들 항경련제가 비슷한 구조식을 가지기 때문이 아닌가 생각된다. 그러나, 장기간 투여한 ethosuximide는 서파수면을 억제하고 반면 1기 수면을 늘리는 효과를 지닌다.²⁴ Phenobarbital도 신경세포막의 과분극(hyperpolarization)을

증가시켜 신경억제를 유발하는 약물로 수면 잠복기를 줄이고, 수면 중 각성을 낮추는 효과가 있으나 서파수면에는 별다른 영향을 미치지 못한다.²¹ 벤조디아제핀계 약물들도 이와 비슷한 성질을 지니며, 서파수면을 감소시킨다.²⁵ Valproate는 GABA transaminase를 억제하여 GABA를 증가시키며, 서파수면이 증가되고 REM수면은 감소된다.²⁶ 새로운 항경련제들은 고전적인 약물들이 가진 상기 부작용이 상대적으로 적다고 알려져 있으나,²⁷ 보다 많은 경험이 필요하다. 표 2에는 대표적인 항경련제가 수면에 끼치는 영향이 요약 되어있다. 약물들의 고유한 성질들을 정확히 이해한 후 적절한 항경련제를 선택하면 환자들의 보다 효율적인 수면의 유지에 큰 도움이 될 것이다.

4. 수면장애와 간질

1) 수면장애의 유병률

약 2/3 이상의 간질환자들이 수면장애를 호소하는데,²⁸ 68%의 환자들이 주간 졸림증을 호소하며, 39%는 입면의 어려움을 얘기한다. PSG를 시행한 연구에서는 약 1/3의 환자들에서 이상소견을 보였다고 한다.²⁹ 158명의 간질환자들을 대상으로 한 연구에서는 Epworth Sleepiness Scale (ESS)이 10 이상으로 증가한 경우가 28%이며, 44%의 환자들은 TV시청 도중 잠에 빠져든다고 호소하였다.³⁰ 간질환자에서 수면장애의 호소가 잦은 이유는 수면 조절과 수면-각

Table 2. Antiepileptic Medication Effects on Sleep.

Drug	Sleep Efficiency	Total Sleep Time	Sleep Latency	Arousals	Stage 1	Stage 2	Stage 3/4	REM Sleep	Sleep Complaint
Phenytoin	Decrease	No change	Decrease	Decrease	Increase	Increase	Decrease	No change	Sleepiness
Carbamazepine	Increase	No change	Decrease	Decrease	No change	No change	Increase	Decreased early, no change chronically	Sleepiness
Phenobarbital	Decrease	No change	Decrease	Decrease	Increase	Increase	No change	Decrease	Sleepiness
Ethosuximide	Decrease	Unknown	Unknown	Increase	Increase	No change	Decrease	Increase	Insomnia
Valproate	No change	No change	No change	Increase	Decrease	No change	Increase	Mild decrease	
Felbamate	Decrease	Not tested							Insomnia
Lamotrigine	No change	No change	No change	No change	No change	No change	Unclear	Mild increase	Insomnia
Gabapentin	Increase	Increase		Decrease	Decrease	No change	Increase	Increase	Sleepiness
Topiramate	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Sleepiness
Vigabatrin	Unknown	No change	No change	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Sleepiness
Tiagabine	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Insomnia
Levetiracetam	No change	No change	No change	No change	No change	Increase	Decrease	No change	Sleepiness
Zonisamide	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Insomnia

성에 관계된 증상들을 감지하는 뇌조직의 기능 이상 때문으로 생각하고 있다. 수면 무호흡증과 간질의 관련성이 잘 알려진 예이다.

2) 폐쇄성 수면무호흡증 (obstructive sleep apnea, OSA)

수면무호흡증을 가진 환자의 약 4%에서 간질이 동반되어 있다고 한다.³¹ 그리고 OSA의 치료가 경련의 빈도를 줄인다는 보고들이 있다.³²⁻³⁵ 그 중 한 연구에서는 OSA의 치료 이후 40%의 환자에서 경련이 소실 되었다.³³ 결국 OSA가 수면의 빈도를 증가시킬 수 있는데, 수면의 박탈과 저산소증이 원인으로 여겨진다. 수면의 박탈 및 분절화는 환자의 피로를 증가시킴으로써 경련을 쉽게 유발시킬 수 있고, 동물 실험을 통해 저산소증이 항경련효과를 감소시키는 것이 알려져 있다.³⁶ 신경계 질환들은 수면 동안의 호흡패턴을 변화시킬 수 있고 경련의 치료제가 수면무호흡증을 악화시키는데, valproate, vigabatrin, gabapentin은 체중증가를 유발하여 무호흡을 증가시키며, 벤조디아제핀과 바비탈계열 약물들은 이산화탄소와 저산소증에 대한 신체의 감응도를 저하시켜 무호흡증이 악화될 수 있다. 미주신경자극술은 측후두근육들(lateral laryngeal muscles)의 근긴장도를 높이며 상기도 저항을 늘려 수면무호흡증이 악화된다고 하였다.^{37,38}

3) 하지불안증후군

간질환자들에서의 정확한 유병률은 알려져있지 않으나, zonisamide나 phenytoin등의 항경련제는 증상의 악화를 유발한다고 한다.^{39,40}

5. 치료

일반인들과 마찬가지로 간질환자에서의 수면장애 증상들은 주간과다수면, 불면증, 사건수면 등의 양상으로 나타나므로 원인질환의 정확한 진단이 무엇보다 중요하다.

1) 주간과다수면의 치료적 접근

수면환경의 개선이 중요한데, 조용하고 어두우며 안락한 침실환경을 반드시 갖추도록 하고, 수면위생을 적절히 유지하도록 도와주어야 한다. 수면장애 유무를 확인할 수 있는 여러가지 임상척도들(특히 ESS)을 활용하고, 특별한 이유가 파악되지 않는 환자들은 overnight PSG를 직접 시행하는 것이 큰 도움이 된다. 항경련제가 주간과다수면의 원인으로 고려될 수 있는데, 약물투여의 패턴을 교정하면 환자들에게 도움을 줄 수 있다. 경련이 주로 밤에 나타나는 환자에서는 sedative effect가 있는 약을 저녁에 투여하면 수면과

경련억제 모두에 도움을 줄 수 있고, regular release 형태의 약제가 급격한 혈중 농도의 저하를 막아주므로 효과적이다. 또한 간질환자들에서 정동장애가 흔하며 이로 인해 피로와 주간졸림증이 늘어나므로 항우울제의 적절한 사용이 도움이 되며 졸음을 유발하는 약제는 저녁에 투여하는 것을 권장한다. 주간과다수면을 촉진시키는 특별한 원인이 확인되지 않은 경우 뇌각성제를 투여할 수 있는데, 경련의 빈도를 증가시키고 약물 상호작용의 위험이 있어 세심한 주의를 요한다.

2) 불면증의 치료

간질환자들에서 불면증을 조장하는 원인들은 여러 가지가 있는데, 내성적인 성격, 일반인에 비해 상대적으로 적은 대외활동 등이 환경적인 요인이 될 수 있고, 오후에 카페인을 섭취하는 것도 흔한 악화원인이 된다. TV나 비디오게임, 컴퓨터 등 적절한 수면환경을 방해하는 것들은 억제하는 것이 도움이 되며, 수면위생의 교육도 중요하다. 불안증이 동반된 환자들은 항불안제나 지지요법, 바이오피드백 등이 도움이 될 수 있다. 잦은 각성이 간질과의 활성화로 유발되는 경우엔 sedating효과를 지닌 항경련제의 용량을 증가해서 저녁에 투여하는 것이 적절하고, 원인 파악을 위해 PSG를 시행하여 하지불안증후군, 폐쇄성 무호흡증, 주기성사지마비증 등의 동반된 수면질환 여부를 확인하는 것도 중요하다. 항경련제 중 felbamate, ethosuximide, zonisamide나 lamotrigine은 불면증을 조장할 수 있는 약제로 알려져 있어 증상을 호소하는 환자들에선 상기 약제를 피하는 것이 적절하다.

3) 수면장애의 치료

OSA환자들은 수면자세의 교정, 체중감량, CPAP이나 수술 등으로 도움을 받을 수 있는데, 자면서 착용하는 기구들로 인한 질식의 위험성을 배제할 수 없다. 하지불안증이 있는 환자들은 gabapentin, clonazepam, carbamazepine등이 효과적이라고 알려졌고, gabapentin과 carbamazepine은 야간의 신경병성 통증의 제거에도 도움이 된다.

결론

수면은 간질의 여러 문제들 중 하나로 부적절한 수면은 간질의 진행과정에 큰 영향을 끼칠 수 있고 서로 복잡한 연관성을 보인다. 임상자들은 간질환자들에서 수면장애를 유발하는 원인들을 논리적으로 꼼꼼히 파악하여 보다 효율적인 치료가 가능하며, 수면의 개선은 경련의 조절만이 아니라 환자

들의 삶의 질 향상에 크게 기여할 수 있다.

REFERENCES

1. Passouant P. Historical aspects of sleep and epilepsy. *Epilepsy Res* 1991;2:19-30.
2. Janz D. The grand mal epilepsies and the sleep waking cycle. *Epilepsia* 1962;3:69-109.
3. Herman ST, Walczak TS, Bazil CW. Distribution of partial seizures during the sleep-wake cycle: differences by seizure onset site. *Neurology* 2001;56:1453-1459.
4. Minecan D, Natarajan A, Marzec M, Malow B. Relationship of epileptic seizures to sleep stage and sleep depth. *Sleep* 2002; 25:899-904.
5. Shouse MN, Farber PR, Staba RJ. Physiological basis: how NREM sleep components can promote and REM sleep components can suppress seizure discharge propagation. *Clin Neurophysiol* 2000; 111:9-18.
6. Malow BA, Bowes RJ, Ross D. Relationship of temporal lobe seizures to sleep and arousal: a combined scalp-intracranial electrode study. *Sleep* 2000;23:231-234.
7. Quigg M. Circadian rhythms: interactions with seizures and epilepsy. *Epilepsy Res* 2000;42:43-55.
8. Stewart LS, Leung LS. Temporal lobe seizures alter the amplitude and timing of rat behavioral rhythms. *Epilepsy Behav* 2003;4: 153-160.
9. Arne-Bes MC, Calvet V, Thiberge M, Arbus L. Effects of sleep deprivation in an EEG study of epileptics. In: Sternman BM, Shouse MN, Passouant P, eds. Sleep and Epilepsy New York: Academic Press; 1982:441-452.
10. Ellinson RJ, Wilkin K, Bennett DR. Efficacy of sleep deprivation as an activation procedure in epilepsy patients. *J Clin Neurophysiol* 1984;1:83-101.
11. Thomaides TN, Kerezoudi EP, Chaudhuri LR, Cheropoulous C. Study of EEG's following 24 hour sleep deprivation in patients with post traumatic epilepsy. *Eur Neurol* 1992;32:79-82.
12. Dinner DS. Effect of sleep on epilepsy. *J Clin Neurophysiol* 2002;19:504-513.
13. Steriade M, Amzica F. Sleep oscillations developing into seizures in corticothalamic systems. *Epilepsia* 2003;44:9-20.
14. Staba RJ, Wilson CL, Bragin A, Fried I, Engel J. Sleep states differentiate single neuron activity recorded from human epileptic hippocampus, entorhinal cortex and subiculum. *J Neurosci* 2002; 22:5694-5704.
15. Kumar P, Raju TR. Seizure susceptibility decreases with enhancement of rapid eye movement sleep. *Brain Res* 2001;922:299-304.
16. Malow BA, Passaro E, Milling C, Minecan DN, Levy K. Sleep deprivation does not affect seizure frequency during inpatient video -EEG monitoring. *Neurology* 2002;59:1371-1374.
17. Touchon J, Baldy-Moulinier M, Billiard M, Beset A, Cadihac J. Sleep organization and epilepsy. *Epilepsy Res* 1991;2:73-81.
18. Besset A. Influence of generalized seizures on sleep organization. In: Sternman MB, Shouse MN, Passouant P, eds. Sleep and Epilepsy New York: Academic Press; 1982:339-346.
19. Bazil CW, Walczak TS. Effect of sleep and sleep stage on epileptic and nonepileptic seizures. *Epilepsia* 1997;38:56-62.
20. Marzec ML, Malow BA. Approaches to staging sleep in polysomnographic studies with epileptic activity. *Sleep Med* 2003; 4:409-417.
21. Wolf P, Roder-Wanner UU, Brede M. Influence of therapeutic phenobarbital and phenytoin medication on the polygraphic sleep of patients with epilepsy. *Epilepsia* 1984;25:467-475.
22. Roder-Wanner UU, Noachtar S, Wolf P. Response of polygraphic sleep to phenytoin treatment for epilepsy. A longitudinal study of immediate short-and long-term effects. *Acta Neurol Scand* 1987; 76:157-167.
23. Gigli GL, Placidi F, Diomedi M, et al. Nocturnal sleep and daytime somnolence in untreated patients with temporal lobe epilepsy: changes after treatment with controlled release carbamazepine. *Epilepsia* 1997;38:696-701.
24. Roder UU, Wolf P. Effects of treatment with dipropylacetate and ethosuximide on sleep organization in epileptic patients. In: Dam M, Gram L, Perry JH, eds. Excessive Daytime Sleepiness. Advances in Epileptology: XII Epilepsy International Symposium New York: Raven Press; 1981:145-153.
25. Copinschi G, Van Onderbergen A, L' Hermite-Baleriaux M, et al. Effects of the short-acting benzodiazepine triazolam, taken at bedtime, on circadian and sleep related hormonal profiles in normal men. *Sleep* 1990;13:232-244.
26. Harding GF, Alford CA, Powell TE. The effect of sodium valproate on sleep, reaction times, and visual evoked potential in normal subjects. *Epilepsia* 1985;26:597-601.
27. Placidi F, Diomedi M, Scalise A, Marciani MG, Romigi A, Gigli GL. Effect of anticonvulsants on nocturnal sleep in epilepsy. *Neurology* 2000;54:25-32.
28. Nagarajan L, Walsh P, Gregory P, Stick S, Maul J, Ghosh S. Respiratory pattern changes in sleep in children on vagal nerve stimulation for refractory epilepsy. *Can J Neurol Sci* 2003;30:224-227.
29. Newell SA, Drake ME Jr. Sleep apnea and periodic leg movements in epilepsy. *Clin Electroencephalogr* 1994;25:153-155.
30. Malow BA, Bowes RJ, Lin X. Predictors of sleepiness in epilepsy patients. *Sleep* 1997;20:1105-1110.
31. Sonka K, Juklichova M, Pretl M, Dostalova S, Horinek D, Nevsimlova S. Seizures in sleep apnea patients: occurrence and time distribution. *Sb Lek* 2000;101:229-232.
32. Devinsky O, Ehrenberg B, Bathlen GM, Abramson HS, Lucian D. Epilepsy and sleep apnea syndrome. *Neurology* 1994;44:2060-2064.
33. Vaughn BV, D' Cruz OF, Beach R, Messenheimer JA. Improvement of epileptic seizure control with treatment of obstructive sleep apnea. *Seizure* 1996;5:73-78.
34. Ezpeleta D, Garcia-Penna A, Peraita-Adrados R. Epilepsia syndrome de apnea del sueno. *Rev Neurol* 1998;26:389-392.
35. Koh S, Ward SL, Lin M, Chen LS. Sleep apnea treatment improves seizure control in children with neurodevelopmental disorders. *Pediatr Neurol* 2000;22:36-39.

36. Zgodzinski W, Rubaj A, Kleinrok Z, Sieklucka-Dziuba M. Effect of adenosine A1 and A2 receptor stimulation on hypoxia induced convulsions in adult mice. *Pol J Pharmacol* 2001;53:83-92.
37. Holmes MD, Chang M, Kapur V. Sleep apnea and excessive daytime somnolence induced by vagal nerve stimulation. *Neurology* 2003; 61:1126-1129.
38. Marzec M, Edwards J, Sagher O, Fromes G, Malow BA. Effects of vagus nerve stimulation on sleep-related breathing in epilepsy patients. *Epilepsia* 2003;44:930-935.
39. Chen JT, Garcia PA, Alldredge BK. Zonisamide-induced restless legs syndrome. *Neurology* 2003;60:147.
40. Drake ME. Restless legs with antiepileptic drug therapy. *Clin Neurol Neurosurg* 1988;90:151-154.